




Desinfektionsplan


Arztraum




WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
H Ä N D E H Y G I E N E (s. Modul P – 1)				
Kontrolle der Hände 	zu Arbeitsbeginn während Arbeiten in Hygienebereichen	+ kein Schmuck an Händen und Unterarmen (auch kein Ehering!) + Fingernägel kurz und gepflegt + keine künstlichen oder kosmetisch behandelten Fingernägel		gesamtes Sanitätspersonal
Händewaschen 	vor Arbeitsbeginn bei sichtbarer Verschmutzung nach Toilettengang	+ Waschlotion in die Hände + nicht zu heiß, nicht zu oft + schonend abtrocknen mit Papierhandtuch	Bactolin sensitive	gesamtes Sanitätspersonal
Hygienische Händedesinfektion 	vor Patientenkontakt aseptischer Tätigkeit nach Patientenkontakt Kontakt mit Ausscheidungen, etc. Patientenumgebung Handschuhwechsel Toilettengang	+ 30 Sekunden durchführen (Achtung! abweichende Zeiten bei bestimmten Infektionen!) + Hände einreiben bis sie trocken sind + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic 3-5 ml 30 Sekunden o. Sterillium virugard 3-5 ml 300 Sekunden	gesamtes Sanitätspersonal
Hautschutz Hautpflege 	während Arbeitspausen nach Arbeitsende	+ Wandspender + Hauttyp und Tätigkeit beachten + individuelle Hautpflegemittel + bei Tuben, Dosen: nur personenbezogen verwenden	Linola Hautmilch	gesamtes Sanitätspersonal
BEKLEIDUNG / P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Modul P – 2)				
Sonderbekleidung weiß 	bei Patientenkontakt bei Umgang mit Medizinprodukten	+ getrennte Aufbewahrung im Spind + mind. alle 2-3 Tage und bei sichtbarer Verschmutzung wechseln + nicht außerhalb der Sanitätseinrichtung tragen	Aufbereitung durch Wäscherei Firma Saubermann	in der Patientenversorgung eingesetztes Sanitätspersonal
Handschuhe 	+ aseptische Tätigkeiten + Beseitigen von Kontaminationen + Aufbereitung Medizinprodukte + bei Flächendesinfektion chemikalienresistente Handschuhe	+ trockene, saubere Hände + nicht beschädigte Handschuhe + Tragezeit begrenzen + Wechsel bei Beschädigung + trocken	geeignete Handschuhe gem. Handschuhplan	gesamtes Sanitätspersonal
Atemschutz 	Mund-Nasenschutz (MNS) bei: + operativen Eingriffe + unklarer Infektlage + Aerosolen	+ auf Beschädigung achten + Tragezeit begrenzen (max. nach 2 Std. oder bei Durchfeuchtung wechseln)	Mund-Nasenschutz (MNS) + möglichst FFP-1-Qualität	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Kopfschutz 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Rachenabstriche + Abszesseröffnung + V.a. aerogen übertragbare Infektionen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Übertragung durch Bindehäute möglich! Haare schützen vor: + Aerosolen, Spritzern	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + Einmalkopfhaut	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Schutzkleidung 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Verbandwechsel + Wundspülungen + sämtliche Übertragungswege	Körper schützen vor: + Aerosolen, Spritzern + großflächigen Kontaminationen lange Überlebensdauer von Erregern auf Oberflächen	+ Einmalschutzkittel - flüssigkeitsdicht - Ärmelbündchen + Kittelschürze - wasserdicht	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal





erstellt durch:		Freigabe durch:		Version: 2.0	Seite 1 von 2
Datum:		Stand:			

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
A S E P T I S C H E T Ä T I G K E I T E N (s. Modul P – 4)				
Hautdesinfektion 	unmittelbar vor aseptischer Tätigkeit	+ je nach Hautareal 15 sec. bzw. 10 min mit sterilisiertem Tupfer + bei Gelenken, Hohlorganen, etc.: sterile Tupfer!	Haut: <i>Octeniderm farblos</i> <i>15 Sekunden</i> Schleimhaut: <i>Präparat</i> <i>Dosis</i> <i>Einwirkzeit</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Mehrdosisbehälter 	unmittelbar vor Entnahme	+ Verwendung von Spike-Mehrfachentnahmekanüle mit Bakterienfilter + alternativ je Injektion neue Entnahmekanüle (danach sofort entfernen) + Desinfektion Gummistopfen mit Hautdesinfektionsmittel	Hautdesinfektionsmittel: <i>Octeniderm farblos</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Arbeitsflächen 	vor und nach der Tätigkeit	Einsatz von Desinfektionstüchern Gebrauchsfertig: (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
verwendetes Gerät 	+ vor und nach Anwendung + sofort bei sichtbarer Verschmutzung + nach Arbeitsende	Erstes Desinfektionstuch: Verschmutzung beseitigen Zweites Desinfektionstuch: Wischdesinfektion	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Untersuchungs-liege 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
patientennahe Flächen 	+ bei sichtbarer Verschmutzung + bei infektiösen Patienten + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
R O U T I N E D E S I N F E K T I O N (s. Modul P – 4)				
RR-Manschette Stethoskop 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	gesamtes Sanitätspersonal
horizontale Flächen 	+ wöchentlich + bei Verschmutzung	Wischdesinfektion mit Desinfektionstüchern	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Waschbecken 	+ täglich + bei Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards		Reinigungspersonal
Wandspender 	Händedesinfektionsmittel + täglich außen + bei Wechsel der Flasche Handwaschlotion + täglich außen + bei Wechsel / Nachfüllen d. Fl.	+ außen Desinfektionstuch + innen mit heißem Wasser durchspülen	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal benennen
Fußböden 	+ täglich + bei starker Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards Nur bei Eingriffsräumen: Flächenwischdesinfektion durch Reinigungsfirma		Reinigungspersonal
Abfalleimer 	täglich	+ Entsorgung gem. Abfallschlüssel + Schutzhandschuhe	+ Einsetzen geeigneter Mülltüten	Reinigungspersonal




erstellt durch:		Freigabe durch:		Version: 2.0	Seite 2 von 2
Datum:		Stand:			






WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
H Ä N D E H Y G I E N E (s. Modul P – 1)				
Kontrolle der Hände 	zu Arbeitsbeginn während Arbeiten in Hygienebereichen	+ kein Schmuck an Händen und Unterarmen (auch kein Ehering!) + Fingernägel kurz und gepflegt + keine künstlichen oder kosmetisch behandelten Fingernägel		gesamtes Sanitätspersonal
Händewaschen 	vor Arbeitsbeginn bei sichtbarer Verschmutzung nach Toilettengang	+ Waschlotion in die Hände + nicht zu heiß, nicht zu oft + schonend abtrocknen mit Papierhandtuch	Bactolin sensitive	gesamtes Sanitätspersonal
Hygienische Händedesinfektion 	vor Patientenkontakt aseptischer Tätigkeit nach Patientenkontakt Kontakt mit Ausscheidungen, etc. Patientenumgebung Handschuhwechsel Toilettengang	+ 30 Sekunden durchführen (Achtung! abweichende Zeiten bei bestimmten Infektionen!) + Hände einreiben bis sie trocken sind + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic 3 - 5 ml 30 Sekunden o. Sterillium virugard 3 - 5 ml 30 Sekunden	gesamtes Sanitätspersonal
Hautschutz Hautpflege 	während Arbeitspausen nach Arbeitsende	+ Wandspender + Hauttyp und Tätigkeit beachten + individuelle Hautpflegemittel + bei Tuben, Dosen: nur personenbezogen verwenden	Linola Hautmilch	gesamtes Sanitätspersonal
BEKLEIDUNG / P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Modul P – 2)				
Sonderbekleidung weiß 	bei Patientenkontakt bei Umgang mit Medizinprodukten in speziellen Bereich z.B. Endoskopie, Bereichskleidung tragen inkl. Schuhe	+ getrennte Aufbewahrung im Spind + mind. alle 2- 3 Tage und bei sichtbarer Verschmutzung wechseln + nicht außerhalb der Sanitätseinrichtung tragen	Aufbereitung durch Wäscherei Firma Saubermann	in der Patientenversorgung eingesetztes Sanitätspersonal
Handschuhe 	+ aseptische Tätigkeiten + Beseitigen von Kontaminationen + Aufbereitung Medizinprodukte + bei Flächendesinfektion chemikalienresistente Handschuhe	+ trockene, saubere Hände + nicht beschädigte Handschuhe + Tragezeit begrenzen + Wechsel bei Beschädigung + trocken	geeignete Handschuhe gem. Hygieneleitfaden	gesamtes Sanitätspersonal
Atemschutz 	Mund-Nasenschutz (MNS) bei: + operativen Eingriffe + unklarer Infektlage + Aerosolen	+ auf Beschädigung achten + Tragezeit begrenzen (max. nach 2 Std. oder bei Durchfeuchtung wechseln)	Mund-Nasenschutz (MNS) + möglichst FFP-1-Qualität	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Kopfschutz 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Rachenabstriche + Abszesseröffnung + V.a. aerogen übertragbare Infektionen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Übertragung durch Bindehäute möglich! Haare schützen vor: + Aerosolen, Spritzern	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + Einmalkopfhaube	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Schutzkleidung 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Verbandwechsel + Wundspülungen + sämtliche Übertragungswege	Körper schützen vor: + Aerosolen, Spritzern + großflächigen Kontaminationen lange Überlebensdauer von Erregern auf Oberflächen	+ Einmalschutzkittel - flüssigkeitsdicht - Ärmelbündchen + Kittelschürze - wasserdicht	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
A S E P T I S C H E T Ä T I G K E I T E N (s. Modul P – 4)				
Hautdesinfektion 	unmittelbar vor aseptischer Tätigkeit	+ je nach Hautareal 15 sec. bzw. 10 min mit sterilisiertem Tupfer + bei Gelenken, Hohlorganen, etc.: sterile Tupfer!	Haut: <i>Octeniderm farblos</i> 15 Sekunden Schleimhaut: <i>Präparat</i> <i>Dosis</i> <i>Einwirkzeit</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Mehrdosisbehälter 	unmittelbar vor Entnahme	+ Verwendung von Spike-Mehrfachentnahmekanüle mit Bakterienfilter + alternativ je Injektion neue Entnahmekanüle (danach sofort entfernen) + Desinfektion Gummistopfen mit Hautdesinfektionsmittel	Hautdesinfektionsmittel: <i>Octeniderm farblos</i> 15 Sekunden	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Arbeitsflächen 	vor und nach der Tätigkeit	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig: (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
verwendetes Gerät 	+ vor und nach Anwendung + sofort bei sichtbarer Verschmutzung + nach Arbeitsende	Erstes Desinfektionstuch: Verschmutzung beseitigen Zweites Desinfektionstuch: Wischdesinfektion	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Untersuchungs-liege 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
patientennahe Flächen 	+ bei sichtbarer Verschmutzung + bei infektiösen Patienten + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
A U F B E R E I T U N G (s. Modul P – 7)				
Persönliche Schutzausrüstung   	+ bei Kontakt mit gebrauchten Instrumenten + beim Umgang mit Desinfektionslösungen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Hände schützen vor: + Verletzung mit Instrumenten Körper schützen vor: + Sekreten, Blut, etc. + Desinfektionsmittel	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + schnittfeste Handschuhe	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Instrumente 	spätestens 30 Minuten nach Gebrauch	1. Trocken sammeln 2. Vorreinigung 3. in Desinfektionslösung legen 4. gründlich abspülen 5. manuelle Reinigung 6. Spülung und Trocknung 7. Sichtkontrolle / Pflege 8. Verpackung	+ geeigneter Raum + geeigneter Schutz + geeignete Mittel + geeignete Verfahren	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Umgang mit Desinfektionsmittel 	während der + Herstellung + Verwendung und + Entsorgung von Instrumentendesinfektionsmitteln	+ Lösung max. 30° C. + erst Wasser, dann Konzentrat + kein Mischen mit - anderen Desinfektionsmitteln - Reinigungsmitteln + Dosiertabelle verwenden + Dosierhilfen verwenden	+ geeignete Mischbehältnisse + Messbecher oder + Dosierpumpen + Desinfektionsmittel-dosiergeräte	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
ROUTINEDESINFEKTION (s. Modul P – 4)				
RR-Manschette Stethoskop 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	gesamtes Sanitätspersonal
horizontale Flächen 	+ wöchentlich + bei Verschmutzung	Wischdesinfektion mit Desinfektionstüchern	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medizinschränke, Verbandwagen 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen monatlich	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben) oder Desinfektionsschaum	<i>Incidin OxyWipes o. Incidin OxyFoam</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medikamenten- kühlschränke 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen vierteljährlich	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Waschbecken 	+ täglich + bei Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards		Reinigungspersonal
Wandspender 	Händedesinfektionsmittel + täglich außen + bei Wechsel der Flasche Handwaschlotion + täglich außen + bei Wechsel bzw. Nachfüllen der Flasche	+ außen Desinfektionstuch + innen mit heißem Wasser durchspülen	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal benennen
Fußböden 	+ täglich + bei starker Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards Nur bei Eingriffsräumen: Flächenwischdesinfektion durch Reinigungsfirma		Reinigungspersonal
Abfalleimer 	täglich	+ Entsorgung gem. Abfallschlüssel + Tragen von Schutzhandschuhen	+ Einsetzen geeigneter Mülltüten	Reinigungspersonal


WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
H Ä N D E H Y G I E N E (s. Module P – 1, P – 6)				
Kontrolle der Hände 	zu Arbeitsbeginn während Arbeiten im Eingriffsraum	+ kein Schmuck an Händen und Unterarmen, Hals, Ohren (auch kein Ehering!) + Fingernägel kurz und gepflegt + keine künstlichen oder kosmetisch behandelten Fingernägel		eingesetztes Sanitätspersonal
Händewaschen 	vor erstem Eingriff bei sichtbarer Verschmutzung	+ Waschlotion in die Hände + nicht zu heiß + Fingerspitzen bis Ellenbogen + schonend abtrocknen mit Papierhandtuch ACHTUNG! keine Nagelbürste!	Bactolin sensitive 1 Minute	eingesetztes Sanitätspersonal
Hygienische Händedesinfektion 	vor Patientenkontakt aseptischer Tätigkeit nach Patientenkontakt Kontakt mit Ausscheidungen, etc. Patientenumgebung Handschuhwechsel Toilettengang	+ 30 Sekunden durchführen (Achtung! abweichende Zeiten bei bestimmten Infektionen!) + Hände einreiben bis sie trocken sind + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic o. Sterillium virugard 3-5 ml 30 Sekunden	gesamtes Sanitätspersonal
Chirurgische Händedesinfektion 	vor operativem Eingriff	+ 3 Minuten durchführen (Mittel wiederholt neu) + Hände kontinuierlich einreiben + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic 3 Minuten	eingesetztes Sanitätspersonal
Hautschutz Hautpflege 	während Arbeitspausen nach Arbeitsende	+ Wandspender + Hauttyp und Tätigkeit beachten + individuelle Hautpflegemittel + bei Tuben, Dosen: nur personenbezogen verwenden	Linola Hautmilch	gesamtes Sanitätspersonal
BEKLEIDUNG / P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Module P – 2, P – 6)				
OP-Kleidung 	bei Eingriffen	+ grundsätzlich Bereichskleidung + grundsätzlich OP-Schuhe + ggf. Sonderbekleidung, weiß + darüber steriler Schutzkittel	Einmalprodukte	eingesetztes Sanitätspersonal
Handschuhe 	+ aseptische Tätigkeiten + Beseitigen von Kontaminationen + zusätzlich steril für Eingriff (ggf. doppelt)	+ trockene, saubere Hände + nicht beschädigte Handschuhe + OP-Handschuhe über Ärmelbündchen + Wechsel bei Beschädigung	geeignete Handschuhe gem. Hygieneleitfaden	eingesetztes Sanitätspersonal
Atemschutz 	Mund-Nasenschutz (MNS) bei: + operativen Eingriffen + unklarer Infektlage + Aerosolen FFP-Maske bei: + aerogen übertragbaren Erregern + Absaugen, Intubieren wenn Infektionsgefahr	+ trocken + auf Beschädigung achten + Tragezeit begrenzen (max. nach 2 Std. oder bei Durchfeuchtung wechseln) bei FFP: + max. 30 Minuten + dichter Sitz + patientenbezogen keine FFP-Maske mit Ventil für Patient!	Mund-Nasenschutz (MNS) + möglichst FFP-1-Qualität + FFP-2- Maske mit Ventil	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Kopfschutz 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Rachenabstriche + Abszesseröffnung + V.a. aerogen übertragbare Infektionen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Übertragung durch Bindehäute möglich! Haare schützen vor: + Aerosolen, Spritzern	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + Einmalkopfhaut	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
erstellt durch:		Freigabe durch:	Version:	Seite 1
Datum:		Stand:	2.0	von 3






WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
A S E P T I S C H E T Ä T I G K E I T E N (s. Modul P – 4)				
Hautdesinfektion 	unmittelbar vor + invasiven Eingriffen + Operationen	+ je nach Hautareal 15 sec. bzw. 10 min (siehe Herstellerangaben) mit sterilisiertem Tupfer + bei Gelenken, Hohlorganen, etc.: sterile Tupfer!	Haut: Octeniderm farblos 15 Sekunden Schleimhaut: Präparat Dosis Einwirkzeit	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Mehrdosisbehälter 	unmittelbar vor Entnahme	+ Verwendung von Spike-Mehrfachentnahmekanüle mit Luftfilter / Bakterienfilter + alternativ je Injektion neue Entnahmekanüle (danach sofort entfernen) + Desinfektion Gummistopfen mit Hautdesinfektionsmittel	Hautdesinfektionsmittel: Octeniderm Farblos 15 Sekunden	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Arbeitsflächen 	vor und nach der Tätigkeit	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig: (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
verwendetes Gerät 	+ vor und nach Anwendung + sofort bei sichtbarer Verschmutzung + nach Arbeitsende + vor Abgabe zur Reparatur oder Wartung	Erstes Desinfektionstuch: Verschmutzung beseitigen Zweites Desinfektionstuch: Wischdesinfektion	<i>Incidin OxyWipes</i> o. <i>Herstellerangaben</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
OP- Liege 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
patientennahe Flächen 	+ nach jedem Patienten + bei sichtbarer Verschmutzung + bei infektiösen Patienten + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
A U F B E R E I T U N G (s. Modul P – 7)				
Persönliche Schutzausrüstung 	+ bei Kontakt mit gebrauchten Instrumenten + beim Umgang mit Desinfektionslösungen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Hände schützen vor: + Verletzung mit Instrumenten Körper schützen vor: + Sekreten, Blut, etc. + Desinfektionsmittel	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + schnittfeste Handschuhe	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Instrumente 	spätestens 30 Minuten nach Gebrauch	1. Trocken sammeln 2. Vorreinigung 3. in Desinfektionslösung legen 4. gründlich abspülen 5. manuelle Reinigung 6. Spülung und Trocknung 7. Sichtkontrolle / Pflege 8. Verpackung	+ geeigneter Raum + geeigneter Schutz + geeignete Mittel + geeignete Verfahren	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Umgang mit Desinfektionsmittel 	während der + Herstellung + Verwendung und + Entsorgung von Flächendesinfektionsmitteln	+ Lösung max. 30° C. + erst Wasser, dann Konzentrat + kein Mischen mit - anderen Desinfektionsmitteln - Reinigungsmitteln + Dosiertabelle verwenden + Dosierhilfen verwenden	+ geeignete Mischverhältnisse + Messbecher oder + Dosierpumpen + Desinfektionsmittel-dosiergeräte	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
ROUTINEDESINFEKTION (s. Modul P – 4)				
RR-Manschette Stethoskop 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes o. Herstellerangaben</i>	gesamtes Sanitätspersonal
horizontale Flächen 	+ täglich + bei Verschmutzung	Wischdesinfektion mit Desinfektionstüchern	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medizinschränke, OP- Verbandwagen 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen monatlich	Einsatz von Desinfektionstüchern o. Desinfektionsschaum gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes . Incidin OxyFoam</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Lagerungshilfen 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medikamenten- kühlschränke 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen vierteljährlich	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Waschbecken 	+ täglich + bei Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards		Reinigungspersonal
Wandspender 	Händedesinfektionsmittel + täglich außen + bei Wechsel der Flasche Handwaschlotion + täglich außen + bei Wechsel bzw. Nachfüllen der Flasche	+ außen Desinfektionstuch + innen mit heißem Wasser durchspülen	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal benennen
Fußböden 	+ täglich + bei starker Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards Nur bei Eingriffsräumen: Flächenwischdesinfektion durch Reinigungsfirma		Reinigungspersonal
Abfalleimer 	täglich	+ Entsorgung gem. Abfallschlüssel + Tragen von Schutzhandschuhen	+ Einsetzen geeigneter Mülltüten	Reinigungspersonal

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
H Ä N D E H Y G I E N E (s. Modul P – 1)				
Kontrolle der Hände 	zu Arbeitsbeginn während Arbeiten in Hygienebereichen	+ kein Schmuck an Händen und Unterarmen (auch kein Ehering!) + Fingernägel kurz und gepflegt + keine künstlichen oder kosmetisch behandelten Fingernägel		gesamtes Sanitätspersonal
Händewaschen 	vor Arbeitsbeginn bei sichtbarer Verschmutzung nach Toilettengang	+ Waschlotion in die Hände + nicht zu heiß, nicht zu oft + schonend abtrocknen mit Papierhandtuch	Bactolin sensitive	gesamtes Sanitätspersonal
Hygienische Händedesinfektion 	vor Patientenkontakt aseptischer Tätigkeit nach Patientenkontakt Kontakt mit Ausscheidungen, etc. Patientenumgebung Handschuhwechsel Toilettengang	+ 30 Sekunden durchführen (Achtung! abweichende Zeiten bei bestimmten Infektionen!) + Hände einreiben bis sie trocken sind + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic 3-5 ml 30 Sekunden o. Sterillium virugard 3-5 ml 30 Sekunden	gesamtes Sanitätspersonal
Hautschutz Hautpflege 	während Arbeitspausen nach Arbeitsende	+ Wandspender + Hauttyp und Tätigkeit beachten + individuelle Hautpflegemittel + bei Tuben, Dosen: nur personenbezogen verwenden	Linola Hautmilch	gesamtes Sanitätspersonal
BEKLEIDUNG / P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Modul P – 2)				
Sonderbekleidung weiß 	bei Patientenkontakt bei Umgang mit Medizinprodukten	+ getrennte Aufbewahrung im Spind + mind. alle 2 Tage und bei sichtbarer Verschmutzung wechseln + nicht außerhalb der Sanitätseinrichtung tragen	Aufbereitung durch Wäscherei Firma Saubermann	in der Patientenversorgung eingesetztes Sanitätspersonal
Handschuhe 	+ aseptische Tätigkeiten + Beseitigen von Kontaminationen + Aufbereitung Medizinprodukte + Flächendesinfektion	+ trockene, saubere Hände + nicht beschädigte Handschuhe + Tragezeit begrenzen + Wechsel bei Beschädigung	geeignete Handschuhe gem. Hygieneleitfaden	gesamtes Sanitätspersonal
Atemschutz 	Mund-Nasenschutz (MNS) bei: + operativen Eingriffe + unklarer Infektlage + Aerosolen	+ trocken + auf Beschädigung achten + Tragezeit begrenzen (max. nach 2 Std. oder bei	Mund-Nasenschutz (MNS) + möglichst FFP-1-Qualität	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Kopfschutz 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Rachenabstriche + Abszesseröffnung + V.a. aerogen übertragbare Infektionen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Übertragung durch Bindehäute möglich! Haare schützen vor: + Aerosolen, Spritzern	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + Einmalkopfhaube	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Schutzkleidung 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Verbandwechsel + Wundspülungen + sämtliche Übertragungswege	Körper schützen vor: + Aerosolen, Spritzern + großflächigen Kontaminationen lange Überlebensdauer von Erregern auf Oberflächen	+ Einmalschutzkittel - flüssigkeitsdicht - Ärmelbündchen + Kittelschürze - wasserdicht	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal


erstellt durch:		Freigabe durch:		Version:	Seite 1
Datum:		Stand:		2.0	von 3






WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
VERFAHREN NACH DIAGNOSTISCHEN MAßNAHMEN				
Arbeitsflächen 	vor und nach der Tätigkeit	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig: (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
verwendetes Gerät 	+ vor und nach Anwendung + sofort bei sichtbarer Verschmutzung + nach Arbeitsende	Erstes Desinfektionstuch: Verschmutzung beseitigen Zweites Desinfektionstuch: Wischdesinfektion	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Untersuchungs- liege 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
patientennahe Flächen 	+ bei sichtbarer Verschmutzung + bei infektiösen Patienten + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
EKG-Elektroden 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes, Octeniderm o. Herstellerangaben</i>	gesamtes Sanitätspersonal
Ultraschallsonden 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von geeigneten Desinfektionstüchern (s. Herstellerangaben)	<i>Präparat</i>	
Mundstücke, Lungenfunktion 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	+ Desinfektionslösung nach Dosiertabelle korrekt ansetzen + Einwirkzeit beachten + gründlich abspülen + trocknen	<i>Präparat Dosis Einwirkzeit</i>	<i>eingesetztes SanPersonal FU I</i>
Kabine, Hörtest 	+ wöchentlich + bei sichtbarer Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	<i>eingesetztes SanPersonal FU I</i>

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
ROUTINEDESINFEKTION (s. Modul P – 4)				
RR-Manschette Stethoskop 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	gesamtes Sanitätspersonal
horizontale Flächen 	+ wöchentlich + bei Verschmutzung	Wischdesinfektion mit Desinfektionstüchern	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medizinschränke, Verbandwagen 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen monatlich	Einsatz von Desinfektionstüchern o. Desinfektionsschaum gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i> o. <i>Incidin OxyFoam</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medikamenten- kühlschränke 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen vierteljährlich	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Waschbecken 	+ täglich + bei Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards		Reinigungspersonal
Wandspender 	Händedesinfektionsmittel + täglich außen + bei Wechsel der Flasche Handwaschlotion + täglich außen + bei Wechsel bzw. Nachfüllen der Flasche	+ außen Desinfektionstuch + innen mit heißem Wasser durchspülen	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal benennen
Fußböden 	+ täglich + bei starker Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards Nur bei Eingriffsräumen: Flächenwischdesinfektion durch Vertragsfirma		Reinigungspersonal
Abfalleimer 	täglich	+ Entsorgung gem. Abfallschlüssel + Tragen von Schutzhandschuhen	+ Einsetzen geeigneter Mülltüten	Reinigungspersonal

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
H Ä N D E H Y G I E N E (s. Modul P – 1)				
Kontrolle der Hände 	zu Arbeitsbeginn während Arbeiten in Hygienebereichen	+ kein Schmuck an Händen und Unterarmen (auch kein Ehering!) + Fingernägel kurz und gepflegt + keine künstlichen oder kosmetisch behandelten Fingernägel		gesamtes Sanitätspersonal
Händewaschen 	vor Arbeitsbeginn bei sichtbarer Verschmutzung nach Toilettengang	+ Waschlotion in die Hände + nicht zu heiß, nicht zu oft + schonend abtrocknen mit Papierhandtuch	Bactolin sensitive	gesamtes Sanitätspersonal
Hygienische Händedesinfektion 	vor Patientenkontakt aseptischer Tätigkeit nach Patientenkontakt Kontakt mit Ausscheidungen, etc. Patientenumgebung Handschuhwechsel Toilettengang	+ 30 Sekunden durchführen (Achtung! abweichende Zeiten bei bestimmten Infektionen!) + Hände einreiben bis sie trocken sind + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic 3-5 ml 30 Sekunden o. Sterillium virugard 3-5 ml 30 Sekunden	gesamtes Sanitätspersonal
Hautschutz Hautpflege 	während Arbeitspausen nach Arbeitsende	+ Wandspender + Hauttyp und Tätigkeit beachten + individuelle Hautpflegemittel + bei Tuben, Dosen: nur personenbezogen verwenden	Linola Hautmilch	gesamtes Sanitätspersonal
BEKLEIDUNG / P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Modul P – 2)				
Sonderbekleidung weiß 	bei Patientenkontakt bei Umgang mit Medizinprodukten	+ getrennte Aufbewahrung im Spind + mind. alle 2 Tage und bei sichtbarer Verschmutzung wechseln + nicht außerhalb der Sanitätseinrichtung tragen	Aufbereitung durch Wäscherei Firma Saubermann	in der Patientenversorgung eingesetztes Sanitätspersonal
Handschuhe 	+ aseptische Tätigkeiten + Beseitigen von Kontaminationen + Aufbereitung Medizinprodukte + Flächendesinfektion	+ trockene, saubere Hände + nicht beschädigte Handschuhe + Tragezeit begrenzen + Wechsel bei Beschädigung	geeignete Handschuhe gem. Hygieneleitfaden	gesamtes Sanitätspersonal
Atemschutz 	Mund-Nasenschutz (MNS) bei: + operativen Eingriffe + unklarer Infektlage + Aerosolen	+ trocken + auf Beschädigung achten + Tragezeit begrenzen (max. nach 2 Std. oder bei	Mund-Nasenschutz (MNS) + möglichst FFP-1-Qualität	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Kopfschutz 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Rachenabstriche + Abszesseröffnung + V.a. aerogen übertragbare Infektionen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Übertragung durch Bindehäute möglich! Haare schützen vor: + Aerosolen, Spritzern	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + Einmalkopfhaube	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Schutzkleidung 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Verbandwechsel + Wundspülungen + sämtliche Übertragungswege	Körper schützen vor: + Aerosolen, Spritzern + großflächigen Kontaminationen lange Überlebensdauer von Erregern auf Oberflächen	+ Einmalschutzkittel - flüssigkeitsdicht - Ärmelbündchen + Kittelschürze - wasserdicht	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal


erstellt durch:		Freigabe durch:		Version:	Seite 1
Datum:		Stand:		2.0	von 3






WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
VERFAHREN NACH DIAGNOSTISCHEN MAßNAHMEN				
Arbeitsflächen 	vor und nach der Tätigkeit	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig: (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
verwendetes Gerät 	+ vor und nach Anwendung + sofort bei sichtbarer Verschmutzung + nach Arbeitsende	Erstes Desinfektionstuch: Verschmutzung beseitigen Zweites Desinfektionstuch: Wischdesinfektion	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Untersuchungs- liege 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
patientennahe Flächen 	+ bei sichtbarer Verschmutzung + bei infektiösen Patienten + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
EKG-Elektroden 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>cleanisept</i>	gesamtes Sanitätspersonal
Ultraschallsonden 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von geeigneten Desinfektionstüchern (s. Herstellerangaben)	<i>Präparat</i>	
Kabine, Hörtest 	+ wöchentlich + bei sichtbarer Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal FU I

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
ROUTINEDESINFektion (s. Modul P – 4)				
RR-Manschette Stethoskop 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Mikrocid</i> <i>Cleanisept</i>	gesamtes Sanitätspersonal
horizontale Flächen 	+ wöchentlich + bei Verschmutzung	Wischdesinfektion mit Desinfektionstüchern	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medizinschränke, Verbandwagen 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen monatlich	Einsatz von Desinfektionstüchern o. Desinfektionsschaum gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i> o. <i>Incidin OxyFoam</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medikamenten- kühlschränke 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen vierteljährlich	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Waschbecken 	+ täglich + bei Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards		Reinigungspersonal
Wandspender 	Händedesinfektionsmittel + täglich außen + bei Wechsel der Flasche Handwaschlotion + täglich außen + bei Wechsel bzw. Nachfüllen der Flasche	+ außen Desinfektionstuch + innen mit heißem Wasser durchspülen	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal benennen
Fußböden 	+ täglich + bei starker Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards Nur bei Eingriffsräumen: Flächenwischdesinfektion durch Vertragsfirma		Reinigungspersonal
Abfalleimer 	täglich	+ Entsorgung gem. Abfallschlüssel + Tragen von Schutzhandschuhen	+ Einsetzen geeigneter Mülltüten	Reinigungspersonal

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
H Ä N D E H Y G I E N E (s. Modul P – 1)				
Kontrolle der Hände 	zu Arbeitsbeginn während Arbeiten in Hygienebereichen	+ kein Schmuck an Händen und Unterarmen (auch kein Ehering!) + Fingernägel kurz und gepflegt + keine künstlichen oder kosmetisch behandelten Fingernägel		gesamtes Sanitätspersonal
Händewaschen 	vor Arbeitsbeginn bei sichtbarer Verschmutzung nach Toilettengang	+ Waschlotion in die Hände + nicht zu heiß, nicht zu oft + schonend abtrocknen mit Papierhandtuch	Bactolin sensitive	gesamtes Sanitätspersonal
Hygienische Händedesinfektion 	vor Patientenkontakt aseptischer Tätigkeit nach Patientenkontakt Kontakt mit Ausscheidungen, etc. Patientenumgebung Handschuhwechsel Toilettengang	+ 30 Sekunden durchführen (Achtung! abweichende Zeiten bei bestimmten Infektionen!) + Hände einreiben bis sie trocken sind + nicht in feuchte Hände + nicht auf Schmutz	Sterillium classic 3-5 ml 30 Sekunden o. Sterillium virugard 3-5 ml 30 Sekunden	gesamtes Sanitätspersonal
Hautschutz Hautpflege 	während Arbeitspausen nach Arbeitsende	+ Wandspender + Hauttyp und Tätigkeit beachten + individuelle Hautpflegemittel + bei Tuben, Dosen: nur personenbezogen verwenden	Baktolan	gesamtes Sanitätspersonal
BEKLEIDUNG / P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Modul P – 2)				
Sonderbekleidung weiß 	bei Patientenkontakt bei Umgang mit Medizinprodukten	+ getrennte Aufbewahrung im Spind + mind. alle 2 Tage und bei sichtbarer Verschmutzung wechseln + nicht außerhalb der Sanitätseinrichtung tragen	Aufbereitung durch Wäscherei Firma Saubermann	in der Patientenversorgung eingesetztes Sanitätspersonal
Handschuhe 	+ aseptische Tätigkeiten + Beseitigen von Kontaminationen + Aufbereitung Medizinprodukte + Flächendesinfektion	+ trockene, saubere Hände + nicht beschädigte Handschuhe + Tragezeit begrenzen + Wechsel bei Beschädigung	geeignete Handschuhe gem. Hygieneleitfaden	gesamtes Sanitätspersonal
Atemschutz 	Mund-Nasenschutz (MNS) bei: + operativen Eingriffe + unklarer Infektlage + Aerosolen	+ trocken + auf Beschädigung achten + Tragezeit begrenzen (max. nach 2 Std. oder bei	Mund-Nasenschutz (MNS) + möglichst FFP-1-Qualität	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Kopfschutz 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Rachenabstriche + Abszesseröffnung + V.a. aerogen übertragbare Infektionen	Augen schützen vor: + Aerosolen, Spritzern Übertragung durch Bindehäute möglich! Haare schützen vor: + Aerosolen, Spritzern	+ Schutzbrille mit Seitenschutz + Einmalkopfhaube	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal
Schutzkleidung 	bei Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefahr + Verbandwechsel + Wundspülungen + sämtliche Übertragungswege	Körper schützen vor: + Aerosolen, Spritzern + großflächigen Kontaminationen lange Überlebensdauer von Erregern auf Oberflächen	+ Einmalschutzkittel - flüssigkeitsdicht - Ärmelbündchen + Kittelschürze - wasserdicht	entsprechend eingesetztes Sanitätspersonal

erstellt durch:		Freigabe durch:		Version:	Seite 1
Datum:		Stand:		2.0	von 3

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
VERFAHREN NACH DIAGNOSTISCHEN MAßNAHMEN				
Arbeitsflächen 	vor und nach der Tätigkeit	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig: (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
verwendetes Gerät 	+ vor und nach Anwendung + sofort bei sichtbarer Verschmutzung + nach Arbeitsende	Erstes Desinfektionstuch: Verschmutzung beseitigen Zweites Desinfektionstuch: Wischdesinfektion	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Untersuchungs- liege 	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
patientennahe Flächen 	+ bei sichtbarer Verschmutzung + bei infektiösen Patienten + nach Arbeitsende	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Refraktometer, Mesoptometer, Pentacam, Gesichtsfeld, Tonometer, Perimeter Auflage: Stirn, Kinn, Unterarme	+ nach jedem Patienten + bei grober Verschmutzung	Einsatz von geeigneten Desinfektionstüchern (s. Herstellerangaben)	<i>Mikrozid</i>	eingesetztes Personal <i>FU 4</i>

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
ROUTINEDESINFEKTION (s. Modul P – 4)				
RR-Manschette Stethoskop 	+ täglich nach Gebrauch + nach infektiösen Patienten	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	gesamtes Sanitätspersonal
horizontale Flächen 	+ wöchentlich + bei Verschmutzung	Wischdesinfektion mit Desinfektionstüchern	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medizinschränke, Verbandwagen 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen monatlich	Einsatz von Desinfektionstüchern o. Desinfektionsschaum gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i> o. <i>Incidin OxyFoam</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Medikamenten- kühlschränke 	+ außen täglich + bei Verschmutzung sofort + innen vierteljährlich	Einsatz von Desinfektionstüchern gebrauchsfertig (s. Herstellerangaben)	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes Sanitätspersonal benennen
Waschbecken 	+ täglich + bei Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards		Reinigungspersonal
Wandspender 	Händedesinfektionsmittel + täglich außen + bei Wechsel der Flasche Handwaschlotion + täglich außen + bei Wechsel bzw. Nachfüllen der Flasche	+ außen Desinfektionstuch + innen mit heißem Wasser durchspülen	<i>Incidin OxyWipes</i>	eingesetztes SanPersonal benennen
Fußböden 	+ täglich + bei starker Verschmutzung sofort	Feuchtreinigung gemäß Reinigungsstandards Nur bei Eingriffsräumen: Flächenwischdesinfektion durch Vertragsfirma		Reinigungspersonal
Abfalleimer 	täglich	+ Entsorgung gem. Abfallschlüssel + Tragen von Schutzhandschuhen	+ Einsetzen geeigneter Mülltüten	Reinigungspersonal